VISIT…

LANZAROTE

Caliente.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ЛОШАДИ ПО ЗУБАМ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
ОТДЕЛА

ЗУБЫ ЛОШАДИ

в возрасте

от 6-ти мес. до 3 лет.

(Рис. 1—4).

Рис. 1.


РЕЗЦЫ ЛОШАДЕЙ.



Молочник. Постоянный резец.

Рис. 2.


1/2 года.



Молочные окрайки прорезываются.

Рис. 3.


2 года.



Молочники стираются: на окрайках чашечки ясно заметны.

Рис. 4.

3 года.



Постоянные зацепы выравнялись, они с глубокой чашечкой, на молочных окрайках чашечки исчезают.

ЗУБЫ ЛОШАДИ


в возрасте

от 4 до 6 лет.

(Рис. 5—8).

Рис. 5.


4 года.



Постоянные средние резцы выравнялись, окрайки еще молочные.

Рис. 6.

$4^1/_2$ года.




Прорезываются постоянные окрайки и клыки.

Рис. 7

5 лет.

Нижняя челюсть.




Постоянные окрайки выравнялись; на всех резцах видны отчетливо чашечки.

Рис. 8

6 лет.

Нижняя челюсть.



В зацепах исчезают чашечки.

ЗУБЫ ЛОШАДИ

в возрасте


от 7 до 10 лет.

(Рис. 9—12).

Рис. 9.

7 лет.

Нижняя челюсть.




В средних резцах исчезают чашечки.

Рис. 10.

8 лет.

Нижняя челюсть.



В окрайках исчезают чашечки, в остальных резцах чашечки исчезли.

Рис. 11. **9 лет.**


Вид зубов сбоку.



На верхних окрайках сзади имеется клиновидный выступ „заеды“

Рис. 12. **10 лет.**

Верхняя челюсть.



На зацепах чашечки исчезают.

ЗУБЫ ЛОШАДИ


в возрасте

от 11 до 18 лет.

(Рис. 13—16).

Рис. 13. **11 лет.**


Верхняя челюсть.



Чашечки отчетливо видны только на окрайках.

Рис. 14. **12 лет.**

Верхняя челюсть.




На окрайках лишь следы чашечек.

Рис. 15.

15 лет.

Нижняя челюсть.




Форма всех резцов приближается к округлой.

Рис. 16.

18 лет.

Нижняя челюсть.



Все резцы трехугольной формы.